I. Modélisation

1.1 Définitions :

- Lorsqu'on étudie une partie de la population, on dit qu'on étudie un *échantillon*.
- Le nombre d'individus composant l'échantillon est la *taille de l'échantillon*.
Un échantillon de taille n est obtenu par n répétitions indépendantes de la même expérience.

— Une **expérience aléatoire** est une expérience que l'on peut reproduire dans les mêmes conditions et dont on connaît à priori toutes les résultats possibles, sans pouvoir dire avec certitude le résultat qui se produira.

— **Simuler** une expérience, c'est la remplacer par une autre, plus simple à réaliser, et qui permettra d'obtenir des résultats similaires.

Remarque : Pour cela, on utilise généralement un générateur de nombres au hasard. Il y en a de plusieurs types :

- les tables de nombres au hasard (très peu utilisés de nos jours)
- la commande ALEA.ENTRE.BORNES d'un tableur
- la commande RANDOM des calculatrices

1.2 Utilisation d'un tableur :

Pour simuler un tirage au sort dans un ensemble à p éléments à l'aide d'un tableur, on peut utiliser la méthode suivante :

- On attribue à chaque élément un nombre entre 1 et p .
- On simule le tirage aléatoire en utilisant la commande =ALEA.ENTRE.BORNES(1,p)
- Pour calculer la fréquence d'une issue pour N tirages au sort, on utilise la commande =NB.SI(plage;critère)/N

où la plage est l'ensemble des cellules où ont été effectués les simulations.

1.3 Utilisation de la calculatrice :

Toute calculatrice scientifique possède une fonction RANDOM qui génère une nombre réel au hasard entre 0 et 1 (avec 1 exclu). Combinée avec la fonction Ent qui donne la partie entière d'un nombre, elle permet de simuler de nombreuses expériences.

	Casio	T.I.
Nombre au hasard (RANDOM)	Dans le menu OPTN, sélectionner le menu PROB, puis la commande RAN#. Appuyer sur la touche EXE pour exécuter la commande	Dans le menu MATH, sélectionner le menu PRB, puis la commande NbreAleat (ou Rand). Appuyer sur la touche EXE pour exécuter la commande
Partie entière (Ent)	Dans le menu OPTN, sélectionner le menu NUM, puis la commande Int.	Dans le menu MATH, sélectionner le menu NUM, puis la commande Ent (ou Int).

Exemple : Simuler, à l'aide de la fonction RANDOM, 10 lancers successifs d'un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6.

Il s'agit d'obtenir au hasard un nombre compris entre 1 et 6. Or, la touche RANDOM permet d'obtenir un nombre x tel que $0 \leq x < 1$.

- $6 \times \text{RANDOM}$ permet d'obtenir un nombre y tel que $0 \leq y < 6$
- $\text{Ent}(6 \times \text{RANDOM})$ permet d'obtenir un nombre entier n tel que $0 \leq n \leq 5$
- $\text{Ent}(6 \times \text{RANDOM}) + 1$ permet d'obtenir un nombre entier p tel que $1 \leq p \leq 6$

Il suffit donc d'entrer la fonction $\text{Ent}(6 \times \text{RANDOM}) + 1$ dans la calculatrice et d'appuyer 10 fois de suite sur la touche EXE pour obtenir la simulation voulue.

Propriété 1

Soit p la proportion de la population vérifiant le critère étudié.

Soit $\hat{p}$ la proportion de l'échantillon vérifiant ce même critère.

Plus la taille de l'échantillon est grande, plus $\hat{p}$ se rapproche de p .

Exemple

En lançant deux pièces de monnaie correctement équilibrées, on peut obtenir :

- deux côtés Pile
- deux côtés Face
- un côté Pile et un côté Face

On étudie la fréquence d'obtenir deux côtés Pile.

Pour cela, on simule cette expérience à l'aide d'un tableur.

On étudiera quatre tailles d'échantillon : 100, 200, 500 et 1000.

Remarque

La valeur théorique pour cette expérience est égale à 0,25.

La taille du premier échantillon est égale à 100.

Après 100 lancers, la fréquence d'obtenir deux côtés Pile semble être légèrement supérieure à 0,2.

La taille du quatrième échantillon est égale à 1000.

Après 1000 lancers, la fréquence d'obtenir deux côtés Pile semble être proche de 0,25.

II. Intervalle de fluctuation et intervalle de confiance

Propriété 2 (théorème de l'intervalle de fluctuation – théorème admis)

- On considère un échantillon de taille n supérieure ou égale à 25.
- Le nombre p doit appartenir à l'intervalle $[0,2 ; 0,8]$.

Dans ces conditions, le nombre $\hat{p}$ appartient à l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ dans plus de 95 % des cas.

Exemple :

Dans un casino, sur 2 500 lancers de dé, 1 150 ont donné un nombre pair. Y a-t-il lieu de faire une enquête pour utilisation de dés truqués ?

Si les dés ne sont pas truqués, il y a autant de chances d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair. On assimile la situation à un échantillon de taille $n = 2500$ avec une probabilité $p = 0,5$ d'obtenir un résultat pair.

Comme $\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{2500}} = \frac{1}{50} = 0,02$, alors l'intervalle de fluctuation est : $I = [0,48 ; 0,52]$.

La fréquence observée est $f = \frac{1150}{2500} = 0,46$.

Cette fréquence n'appartient pas à l'intervalle I . On rejette donc l'hypothèse que les dés ne sont pas truqués. Une enquête s'impose.

Attention : cette décision comporte un risque d'erreur puisque dans 5 % des cas, 2 500 lancers avec des dés non truqués peuvent donner une fréquence de nombres pairs n'appartenant pas à l'intervalle I .

Propriété 3 (théorème de l'intervalle de confiance – théorème admis)

- On considère un échantillon de taille n supérieure ou égale à 25.
- Le nombre $\hat{p}$ doit appartenir à l'intervalle $[0,2 ; 0,8]$.

Dans ces conditions, le nombre p appartient à l'intervalle $\left[\hat{p} - \frac{1}{\sqrt{n}} ; \hat{p} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ dans plus de 95 % des cas.

Exemple :

Les 10 000 employés d'une entreprise doivent être consultés sur la nouvelle couleur du sigle de l'entreprise : vert ou rouge. Inquiète du résultat, la direction, qui a fait campagne pour le rouge, a interrogé un échantillon de 100 employés sur leur choix et 54 % ont répondu rouge.

Que peut-on en conclure ?

On assimile la situation à un échantillon de taille $n = 100$, avec une probabilité p inconnue.

La fréquence observée est $\hat{p} = 0,54$. $\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10} = 0,1$.

On obtient donc un intervalle de confiance $I = [0,44 ; 0,64]$.

Il y a donc de très fortes chances que la proportion réelle p soit comprise dans l'intervalle I .

Comme 0,5 appartient à cet intervalle, on ne peut pas savoir qui des partisans du vert ou du rouge vont l'emporter.